

BIOMONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MADIUN DENGAN BIOINDIKATOR MAKROINVERTEBRATA

Joko Widiyanto¹⁾, Ani Sulistyarsi²⁾

FP MIPA IKIP PGRI Madiun

¹email: joko_widiyanto@ymail.com

²email: anismasa81@yahoo.com

Abstract

The objective of this research is to know the varieties of macro invertebrate species and water quality of the rivers in Madiun. The researcher used macro invertebrate as bio indicator. The result of the study can be used as references to the people to fulfill water need. This research used bio monitoring with macro invertebrate as bio indicator. The technique which was used in this research was purposes random sampling. The samples were taken from four differences places. They were taken from the upstream, the middle of the river, and the downstream. The samples were taken once in two weeks for two months. The researcher used Family Biotic Index (FBI) to analyze the data that was supported by physic and chemistry parameter. From the research that has been done in station 1, the researcher found one hundred and fifty species, FBI: 6, 58. It meant that the water quality was bad, with the highest pollution. In station 2, the researcher found two hundreds and seventy nine species, FBI: 6, 49, it meant that water quality was bad with the high pollution. In station 3, the researcher found three hundred and forty two species, FBI = 6, 64. It meant that the water quality was bad, with the high pollution. And in station 4, the researcher found fifty one species FBI=6, 58, meant that the water quality was bad with the high pollution. Based on the macro invertebrate samples that were found in above, the researcher found t13n families were resistant to pollution.

Keywords: *Biomonitoring, bioindicator, macroinvertebrate*

PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dewasa ini mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai memiliki sifat dinamis, maka dalam pemanfaatannya dapat berpotensi mengurangi nilai manfaat dari sungai itu sendiri dan dampak lainnya dapat membahayakan lingkungan secara luas. Beberapa warga lokal yang tinggal di bantaran sungai melakukan mandi, membuang sampah, buang air kecil dan buang air besar di badan air Sungai Madiun, sehingga membutuhkan pengawasan lingkungan yang memadai untuk mencegah sungai menjadi tercemar.

Biomonitoring adalah monitoring kualitas air secara biologi yang dilakukan

dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk (indikator) yang hidup di dalam air. Sedangkan makroinvertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang yang hidup di dasar air laut atau sungai yang menempel pada air maupun lumpur. Makroinvertebrata sebagai bioindikator karena hidup melekat pada substrat dan motilitasnya rendah sehingga dia tidak mudah bergerak berpindah. Menurut Rahayu (2009), biomonitoring adalah monitoring kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk (indikator) yang hidup di dalam air. Sedangkan makroinvertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang yang hidup di dasar air laut atau sungai yang menempel pada air maupun lumpur. Keuntungan dari menggunakan makroinvertebrata sebagai bioindikator karena hidup melekat pada substrat dan motilitasnya rendah sehingga dia tidak mudah bergerak berpindah.

Limbah-limbah dari aktivitas manusia banyak dibuang di aliran sungai, sehingga akan

mencemari air sungai tersebut yang menyebabkan ekosistem sungai menjadi tidak seimbang. Menurut Sungai termasuk dalam ekosistem air tawar. Menurut Zoer'aini Djamil Irwan (2003: 142) menyebutkan bahwa ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH sekitar 6. Pencemaran air yang terjadi di sungai akan mengakibatkan ekosistem air menjadi tidak seimbang.

METODE PENELITIAN

Tempat pengambilan sampel adalah di Sungai Madiun yang melintasi kota Madiun. Sampel air dan makroinvertebrata benthik diambil pada 4 stasiun. Stasiun 1 terletak di bagian paling hulu yaitu daerah Kelurahan Josenan sampai stasiun 4 di bagian paling hilir di daerah Kelurahan Sogaten. Waktu penelitian adalah bulan Januari – Mei 2014.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan di empat stasiun yaitu stasiun I, II, III dan IV. Setiap satu stasiun mempunyai panjang 10 meter, kemudian dibagi menjadi tiga sub stasiun. Pengambilan data diambil setiap 2 minggu sekali selama dua bulan. Penangkapan makroinvertebrata secara langsung dengan menggunakan tangan dan menggunakan alat.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; karung plastik, tali, pinset, plastik kapasitas 1 kg, spidol permanent, karet gelang, kertas label, ballpoint, pensil, jaring, drift net, surber net, substrat buatan, cetok, linggis, cangkul, baki atau nampan, saringan, cawan petri, sarung tangan, saringan, botol, mikroskop, buku kunci determinasi, pH meter, kamera digital, handycam, steroform, *stopwatch*, *secchi disk*, termometer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; air, aquades dan alkohol 70%, Pemilihan lokasi pengambilan dengan teknik *purposive random*

sampling, dengan cara menentukan stasiun pengambilan sampel, yaitu di bagian hulu di daerah Kelurahan Josenan, bagian tengah di daerah Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Winongo, dan di bagian hilir daerah Kelurahan Sogaten Tahap pengambilan data pendukung berupa parameter fisik dan kimia. Pada tahap ini, yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Parameter fisik yang diambil berupa kecepatan aliran, suhu, pH dan kekeruhan.

Tahap berikutnya adalah tahap pengambilan sampel, pemisahan sampel dan mengidentifikasi sampel yang ditemukan selama penelitian di setiap stasiun.

Tahap terakhir dalam monitoring kualitas air adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan suatu nilai kuantitatif atau indeks. Indeks penunjuk kualitas air dapat dihitung dengan beberapa cara, mulai dari cara yang sederhana hingga yang rumit. Analisis data yang dilakukan dalam bio-monitoring kualitas air dengan metode *Family Biotic Index* (FBI).

Menurut Prigi Arisandi (2012: C-301) menyebutkan bahwa perhitungan nilai indeks biotik menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FBI = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i \cdot t_i}{N}}$$

Keterangan:

FBI = nilai indeks makroinvertebrata benthik

i = urutan kelompok familia yang menyusun komunitas makroinvertebrata

x_i = jumlah individu kelompok famili ke-i

t_i = tingkat toleransi kelompok famili ke-i

N = jumlah seluruh individu yang menyusun komunitas makroinvertebrata.

Interpretasi nilai biotik indeks untuk menentukan kualitas air dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada.

Tabel 1. Kualitas Air Berdasarkan Famili Biotik Indeks

FAMILI BIOTIK INDEKS	KUALITAS AIR	TINGKAT PENCEMARAN
0,00 – 3,75	Sangat baik	Tidak terpolusi bahan organik
3,76 – 4,25	Baik sekali	Sedikit terpolusi bahan organik
4,26 – 5,00	Baik	Terpolusi beberapa bahan organik
5,01 – 5,75	Cukup	Terpolusi agak banyak
5,76 – 6,50	Agak buruk	Terpolusi banyak
6,51 – 7,25	Buruk	Terpolusi sangat banyak
7,26 – 10,00	Buruk sekali	Terpolusi berat bahan organik

Sumber: Hilsenhoff (1988)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dari

4 stasiun pengambilan sampel diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Pengamatan Fisik

Parameter	Stasiun I	Stasiun II	Stasiun III	Stasiun IV
Kecepatan aliran	0,025 m/s	0,033 m/s	0,1 m/s	0,066 m/s
Kekeruhan	20,5 cm	25 cm	27,5 cm	35 cm
Suhu	25 ⁰ C	26 ⁰ C	25 ⁰ C	25 ⁰ C
pH	7	7	7	7

Tabel 3. Hasil Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun I Berdasarkan Family Biotic Indeks (FBI)

NO.	FAMILI	JUMLAH	TOLERANSI	Xi*ti
1	Caneidae	2	7	14
2	Ephemerilidae	2	1	2
3	Gomphidae	4	3	12
4	Perlidae	3	1	3
5	Ancylidae	5	6	30
6	Thiaridae	108	7	756
7	Bithyniidae	3	8	24
8	Viviparidae	5	6	30
9	Sphaeriidae	12	6	72
10	Parathelphussidae	6	6	36
Jumlah		150		979

Berdasarkan data tabel di atas nilai perhitungan Family Biotic Indeks (FBI) pada stasiun I adalah sebagai berikut :

$$FBI = \frac{Xi \times ti}{n} = \frac{979}{150} = 6,58$$

Jadi, hasil perhitungan FBI untuk stasiun I termasuk dalam kategori kualitas air **buruk**, dengan tingkat pencemaran **terpolusi sangat banyak**.

Tabel4. Hasil Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun II Berdasarkan *Family Biotic Indeks* (FBI)

NO.	FAMILI	JUMLAH (Xi)	TOLERANSI (ti)	Xi*ti
1	Ephemerilidae	1	1	1
2	Gomphidae	3	3	9
3	Perlidae	4	1	4
4	Ancylidae	78	6	468
5	Thiaridae	163	7	1141
6	Bithyniidae	5	8	40
7	Viviparidae	2	6	12
8	Sphaeriidae	19	6	114
9	Parathelphussidae	4	6	24
Jumlah		279		1813

Berdasarkan data tabel di atas nilai perhitungan *Family Biotic Indeks* (FBI) pada stasiun II adalah sebagai berikut :

$$FBI = \frac{Xi \times ti}{n} = \frac{1813}{279} = 6,49$$

Jadi, hasil perhitungan FBI untuk stasiun II termasuk dalam kategori kualitas air **buruk**, dengan tingkat pencemaran **terpolusi sangat banyak**.

Tabel5. Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun III Berdasarkan *Family Biotic Indeks* (FBI)

NO.	FAMILI	JUMLAH (Xi)	TOLERANSI (ti)	Xi*ti
1	Caneidae	2	7	14
2	Ephemerilidae	3	1	3
3	Gomphidae	7	3	21
4	Perlidae	2	1	2
5	Ancylidae	42	6	252
6	Thiaridae	260	7	1820
7	Bithyniidae	3	8	24
8	Viviparidae	3	6	18
9	Sphaeriidae	12	6	72
10	Cordulegastridae	1	3	3
11	Chlorocyphidae	1	5	5
12	Parathelphussidae	6	6	36
Jumlah		342		2270

Berdasarkan data tabel di atas nilai perhitungan *Family Biotic Indeks* (FBI) pada stasiun III adalah sebagai berikut :

$$FBI = \frac{Xi \times ti}{n} = \frac{2270}{342} = 6,64$$

Jadi, hasil perhitungan FBI untuk stasiun III termasuk dalam kategori kualitas air **buruk**, dengan tingkat pencemaran **terpolusi sangat banyak**.

Tabel 6. Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun IV Berdasarkan *Family Biotic Indeks* (FBI)

NO.	FAMILI	JUMLAH (Xi)	TOLERANSI (ti)	Xi*ti
1	Gomphidae	2	3	6
2	Ancylidae	6	6	36
3	Thiaridae	32	7	224
4	Bithyniidae	2	8	16
5	Viviparidae	3	6	18
6	Sphaeriidae	4	6	24
7	Parathelphussidae	2	6	12
Jumlah		51		336

Berdasarkan data tabel di atas nilai perhitungan *Family Biotic Indeks* (FBI) pada stasiun IV adalah sebagai berikut :

$$FBI = \frac{Xi \times ti}{n} = \frac{336}{51} = 6,58$$

Jadi, hasil perhitungan FBI untuk stasiun IV termasuk dalam kategori kualitas air **buruk**, dengan tingkat pencemaran **terpolusi sangat banyak**.

Dari penelitian berdasarkan parameter kimia yaitu pH, di stasiun I, II, III dan IV masih berada di kisaran angka 7. Menurut Permenkes RI Nomor 416/MENKES-/PER/IX/1990, pH 6,5-9,0 masih memenuhi standart kualitas air bersih. Pada stasiun I, II, III dan IV masih ditemui biota-biota air yang mampu bertahan hidup, namun menunjukkan jumlah dan jenis biota yang berbeda. Menurut Wisnu Arya Wardhana (2004: 75) yang menyatakan bahwa Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisar 6,5-7,5. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air.

Parameter pendukung selain parameter kimia adalah parameter fisik meliputi suhu, kecepatan aliran, dan kekeruhan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, suhu di stasiun I 25°C, stasiun II 26°C, stasiun III 25°C dan stasiun IV 25°C. Dari hasil penukuran tersebut, suhu masih memenuhi standart kualitas air bersih menurut Permenkes RI Nomor

416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu berkisar antara 20⁰-26⁰C. Suhu tertinggi berada di stasiun II. Suhu berhubungan erat dengan kadar DO (*Dissolved Oxygen*) dalam air. Hal ini didukung oleh pernyataan yang menyebutkan bahwa hubungan antara suhu air dan oksigen biasanya berkorelasi negatif, yaitu kenaikan suhu di dalam air akan menurunkan tingkat solubilitas oksigen dan, dengan demikian, menurunkan kemampuan organisme akuatis dalam memanfaatkan oksigen yang tersedia untuk berlangsungnya proses-proses biologi di dalam air (Chay Asdak, 2010: 507).

Kecepatan aliran masing-masing stasiun berbeda-beda. Stasiun I memiliki kecepatan aliran 0,025 m/s, stasiun II memiliki kecepatan aliran 0,033 m/s, stasiun III memiliki kecepatan aliran 0,1 m/s dan stasiun IV memiliki kecepatan aliran 0,066 m/s. Stasiun III memiliki kecepatan aliran paling tinggi karena struktur sedimen sungai yang cenderung dangkal, bebatuan dengan dasar pasir dan kerikil. Pada stasiun I karakter sungainya datar, berlumpur campur pasir dengan kedalaman lebih dalam dibandingkan dengan stasiun lainnya, sehingga mempunyai kecepatan aliran yang relatif lebih rendah dengan stasiun lainnya.

Parameter fisik terakhir yaitu kekeruhan. Kekeruhan stasiun I paling tinggi yaitu 20,5 cm, stasiun II 25 cm, stasiun III 27,5 cm dan stasiun IV 35 cm Kekeruhan pada stasiun I paling tinggi karena pada stasiun tersebut sungainya berlumpur.

Biomonitoring dilakukan dengan bioindikator sebagai parameter utama dengan didukung parameter fisik dan kimia. Metode *Family Biotic Index* (FBI) merupakan metode perhitungan tingkat pencemaran suatu perairan dengan menggunakan indikator berupa keberadaan makroinvertebrata (invertebrata berukuran besar). Total makroinvertebrata yang ditemukan di aliran Sungai Madiun sebanyak 12 Famili, yaitu, Caneidae, Ephemerilidae, Gomphidae, Perlidae, Ancyliidae, Thiaridae, Bithyniidae, Viviparidae, Sphaeriidae, Parathelphussidae, Cordulegastridae dan Chlorocyphidae. Famili makroinvertebrata paling banyak secara berturut-turut mulai dari stasiun III, I, II dan IV.

Berdasarkan hasil perhitungan FBI, stasiun I dengan nilai 6,58, yang berarti termasuk kategori kualitas air buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak. Makroinvertebrata dari famili Thiaridae dan Sphaeriidae ditemukan dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan famili lain yang ditemukan di stasiun I, karena hewan famili ini memiliki nilai toleransi 7 artinya sangat tahan terhadap pencemaran, hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Stevi Mardiani M. M (2012) yang menyatakan bahwa famili Thiaridae merupakan kelompok makroinvertebrata yang tahan bahan pencemar. Pada stasiun II memiliki nilai FBI sebesar 6,49, berarti termasuk dalam kategori agak buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi banyak. Makroinvertebrata dari famili Thiaridae dan Ancyliidae memiliki jumlah yang banyak pada stasiun ini dibandingkan famili lainnya. Stasiun III memiliki nilai FBI sebesar 6,64, berarti termasuk dalam kategori buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak. Meskipun Pada stasiun ini ditemukan jumlah species dan jumlah famili paling banyak yaitu 342 species dan 12 famili, namun memiliki indeks FBI paling tinggi. Makroinvertebrata dari famili Thiaridae dan Ancyliidae memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan 12 famili lainnya. Pada stasiun IV memiliki nilai FBI sebesar 6,58 yang berarti memiliki kategori yang sama dengan stasiun I, II dan III yaitu kategori buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak.

Pada stasiun ini ditemukan paling sedikit species dan jumlah famili, yaitu 51 species dan 7 famili, dengan species paling banyak ditemukan pada famili Thiaridae selanjutnya famili Ancyliidae.

Berdasarkan hasil penelitian dengan bioindikator berupa makroinvertebrata, masing-masing stasiun memiliki jenis famili masing-masing yang toleran dengan kondisi perairan yang ada. Famili Thiaridae dari Ordo Gastropoda memiliki toleransi yang baik dengan kondisi perairan mulai dari yang tercemar ringan sampai berat. Namun untuk famili Ephemerilidae dan Perlidae sudah tidak ditemukan distasiun IV, karena hewan ini memiliki nilai toleransi 1 yang artinya tidak toleran atau sensitif terhadap perairan yang tercemar.

Famili Thiaridae ditemui di semua stasiun dan mendominasi, karena famili ini termasuk makroinvertebrata yang tahan terhadap pencemaran. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Rotua Lelawati S. *et al* (Tanpa Tahun) menyatakan bahwa makroinvertebrata yang lebih tahan terhadap pencemaran seperti Chironomidae merah (Diptera) dan satu kerang-kekerangan, yaitu Thiaridae (Mesogastropoda) muncul pada seluruh stasiun.

Metode FBI mampu menilai tingkat pencemaran Sungai Madiun yang dibagi menjadi empat stasiun penelitian. Berdasarkan nilai FBI tersebut nilai FBI tertinggi adalah pada stasiun I, karena pada stasiun ini air telah melalui perkotaan, dimana semua limbah, baik limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah pasar, dan limbah rumah sakit bermuara di stasiun ini. Menurut Stevi Mardiani M. M., (2012: 11) menyatakan bahwa apabila terdapat bahan pencemar dalam perairan, maka biota yang sangat peka akan hilang karena tidak mampu bertahan hidup. Sebaliknya biota yang sangat toleran, akan tetap dapat hidup pada kualitas air yang buruk. Setiap stasiun memiliki makroinvertebrata yang mendominasi keberadaannya, sehingga terlihat biota yang toleran terhadap kualitas air yang buruk atau tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

makroinvertebrata dapat dijadikan bioindikator dalam melakukan biomonitoring Sungai Madiun. Metode *Family Biotic Index* (FBI) mampu menentukan kualitas air stasiun I, II, III dan IV. Makroinvertebrata yang ditemukan di aliran Sungai Madiun sebanyak 12 Famili, yaitu Caneidae, Ephemerilidae, Gomphidae, Perlidae, Ancylidae, Thiaridae, Bithyniidae, Viviparidae, Sphaeriidae, Parathelphussidae, Cordulegastriidae dan Chlorocyphidae. Famili makroinvertebrata paling banyak secara berturut-turut mulai dari stasiun III, I, II dan IV

Stasiun I memiliki nilai FBI sebesar 6,58 yang berarti termasuk dalam kategori buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak. Stasiun II memiliki nilai FBI sebesar 6,49 yang berarti termasuk dalam kategori agak buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi banyak. Stasiun III memiliki nilai 6,82 yang berarti termasuk dalam kategori buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak. Stasiun IV memiliki nilai 6,58 yang berarti termasuk dalam kategori buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak. Makroinvertebrata yang banyak ditemukan di seluruh stasiun adalah famili Thiaridae, sehingga dapat diketahui bahwa Famili Thiaridae mampu beradaptasi dengan kualitas air yang baik hingga sangat buruk.

REFERENSI

- Agoes Soegianto. 2005. *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anang Prasetyo *et al.* 2004. *SAINS 1 (Energi dan Perubahannya Bumi dan Alam Semesta)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi. 2010. *Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo : BALIHRISTI
- Chay Asdak. 2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Campbell, Neil A. dan Reece, Jane B. 2008. *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*. Terjemahan oleh Damaring Tyas Wulandari. 2010. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2008. *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2*. Terjemahan oleh Damaring Tyas Wulandari. 2010. Jakarta: Erlangga.
- Daud, Anwar. 2011. *Analisis Kualitas Lingkungan*. Yogyakarta: Ombak Effendi, Hefni. 2008. *Telaah Kualitas Air*. Yogyakarta: Kanisius
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar*, (online), (<http://www.dikti.go.id/files/atur/PedomanNilaiLektorKepala-GuruBesar.pdf>. Diunduh 15 Maret 2014
- Eleftherion, A. and McIntyre, A. 2005. *Methods for The Study Marine Benthos Third Edition*. Department of Biologi, University of Crete, Greece and Hellenic Centre for Marine Research, Crete, Greece, Blackwell Science, Australia. Ghufan H. Kordi K dan Andi Baso
- Tancung. 2007. *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budidaya Perairan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Hilda Zulkifli dan Doni Setiawan. 2011. Struktur Komunitas Makrozoobentosdi Perairan Sungai Musi Kawasan Pulokerto sebagai Instrumen Biomonitoring. *Jurnal Natur Indonesia (Online)*, (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JN/article/view/202/196>, Diunduh 12 Maret 2014).
- H. J. Mukono. 2006. *Prinsip Dasar kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Juli Soemirat Slamet. 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Kaligis, Samidjo Broto K., dan Mieke M.. 2005. *Materi Pokok Pendidikan Lingkungan hidup*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Karden Manik, E. S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan.
- Lintang Rina K., Mustofa N. S., dan Suryanti. 2012. Kondisi Perairan Berdasarkan Bioindikator Makrobentos Di Sungai Seketak Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Of Management Of Aquatic Resources* (Online), Vol. I, No.1, (<http://download.portal-garuda.org>, Diunduh tanggal 16 Februari 2014)
- Lintang Rina K., Mustofa N. S., dan Suryanti. 2012. Kondisi Perairan Berdasarkan Bioindikator Makrobentos Di Sungai Seketak Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Of Management Of Aquatic Resources* (Online), Vol. I, No.1, (<http://download.portal-garuda.org>, Diunduh tanggal 16 Februari 2014)
- Muhammad dan Adhi. 2004. *Modul Ajar Pengelolaan Kualitas Air*. Surabaya: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi sepuluh Nopember (ITS).
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: PT
- Odum, P.E. 1994. *Dasar-Dasar Ekologi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peni Pujiastuti, Bagus Ismail, dan Pranoto. 2013. Kualitas dan beban Pencemaran Perairan Waduk Gajah Mungkur. *Jurnal EKOSAINS* (Online), Vol. V, No. 1, (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JN/article/view/202>, Diunduh 12 Maret 2014)
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*. 2002. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Philip Kristanto. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi
- Pramitha, Soraya. 2010. *Analisis Kualitas Air Sungai Aloo, Sidoarjo Berdasarkan Keanekaragaman Dan Komposisi Fitoplankton*. Skripsi. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November. (<http://Digilib.its.ac.id>, diakses 12 Desember 2013).
- Prigi Arisandi. 2012. Studi Kualitas Air Sungai Bone dengan Metode Biomonitori (Online), *Prosiding Seminar Nasional Kimia Unesa 2012*, (<http://fmipa.unesa.ac.id/kimia/wp-content/uploads/2013/11/298-309-Prigi-Arisandi.pdf>, Diunduh 31 Januari 2014).
- Prima Firstyananda. Tanpa Tahun. *Komposisi dan Keanekaragaman Makrozoobentos Di Tiga Lokasi Aliran Sungai Sumber Kuluhan Jabung, Kabupaten Magetan*, (online), (<http://biologi.fst.unair.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/jurnal-Keanekaragaman-Makrozoobentos-di-tiga-lokasi-aliran-sungai-sumber-Kuluhan-Jabung-Kab.-Mage.pdf>, Diunduh 12 Maret 2014)
- Rahayu, Rudy, Meine, Indra, dan Bruno. 2009. *Monitoring Air di Daerah Aliran Sungai*. Bogor : World Agroforestry Centre
- Ratna Siahaan, Andry Indrawan, Dedi Soedharma, dan Lilik B. Prasetyo. 2011. Kualitas Air Sungai Cisade, Jawa Barat-Banten. *Jurnal Ilmiah Sains*, (Online), Vol. 11, No. 2, (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, Diunduh 12 Maret 2014).
- Ricki M. Mulia. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rifgah Marmita, Ratna Siahaan, Roni Koneri, Marnix L. Langoy. 2013. *Makrozoobentos sebagai Indikator Biologi dalam Menentukan Kualitas air Sungai Ranoyapo, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara*, (online), (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/view/2033>, Diunduh 31 Januari 2014).

- Rotua Lelawaty S., Amran Achmad, dan Inayah Yasir. (Tanpa Tahun). *Kualitas Air Sungai Bone (Gorontalo) Berdasarkan Bioindikator Makroinvertebrata*, (online), (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d78f702d6fc5cbcd32df6dc084653877.pdf>), Diunduh 12 Maret 2014).
- Sabaruddin Wagiman Tjokrokusumo. 2006. Bentik Makroinvertebrata sebagai Bioindikator Polusi Lahan Perairan. *Jurnal Hidrosfir* (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JHI/article/view/79/185>), Diunduh 31 Januari 2014).
- Stevi Mardiani M. Maruru. 2012. *Studi Kualitas Air Sungai Bone Dengan Metode Biomonitoring*. Skripsi. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo.
- Subekti Rahayu, Rudi Harta Widodo, Meine van Noordwijk, Indra Suryadi, dan Bruno Suripin. 2004. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Andi.
- Sumadi Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wisnu Arya Wardhana. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zoer'aini Djamal Irwan. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zoer'aini Djamal Irwan. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.