

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN : Studi Kasus di Kabupaten Sumedang**

*(The Optimization of Forest Land Utilization to Improve Environment Quality and People Welfare Surrounding The Forest : Case Study in Sumedang Regency)*

TATI RAJATI<sup>1)</sup>, CECEP KUSMANA<sup>2)</sup>, DUDUNG DARUSMAN<sup>3)</sup>, dan ASEP SAEFUDDIN<sup>4)</sup>

**ABSTRAK**

*To reserve forest land and improve people income, Perum Perhutani Sumedang regency together with people surrounding forest, makes a program to utilize the forest by using agroforestry system. For that reason, researcher is interested in doing a research about the type of crops that can optimize forest land. The objective of the research is to analyze about the utilization of forest land optimally and improve social welfare of the people surrounding the forest in Cipadayungan, Sumedang. The result of the research indicates that the degree of erosion in the research field at the slope of (0-<15)% and (15-<30)%, are still under tolerated erosion but the slope of  $\geq 30\%$  is beyond tolerated erosion. Type of crops that can be used to utilize the land without being clearing grass growing on the forest floor are vanilla and coffee. Those plants are productive crops, while grass can protect the land against erosion.*

Keywords: Optimal, forest, agroforestry, erosion, social welfare

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Manfaat hutan tidak diragukan lagi bagi perekonomian Indonesia namun menurut data statistik dari Departemen Kehutanan (1994), ternyata dari 27,2 juta jiwa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan terdapat 34% masyarakat yang tergolong miskin yang hidupnya tergantung pada sumberdaya hutan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan

---

1) Staf pengajar FKIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Ciputat Tangerang 15418. Fax. (021) 7490147

2) Guru Besar Ekologi Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Darmaga, e-mail: [ipkipb@cbn.net.id](mailto:ipkipb@cbn.net.id)

3) Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Darmaga, e-mail: [akecuuine@cbn.net.id](mailto:akecuuine@cbn.net.id)

4) Staf pengajar dan peneliti pada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan IPA e-mail: [wakilrektor4@ipb.ac.id](mailto:wakilrektor4@ipb.ac.id)

tersebut, diantaranya dikarenakan peningkatan jumlah penduduk serta penyebarannya yang tidak merata. Hal ini mempunyai dampak terhadap penyediaan kebutuhan pangan dan papan untuk dapat menjamin suatu kehidupan yang layak. Menurut Yakin (1997), persoalan penduduk bisa berdampak setempat (wilayah atau negara tertentu), tetapi juga bisa berdampak global. Penduduk yang besar pada suatu negara tertentu membawa persoalan yang serius bagi dunia terutama masalah penyediaan bahan makanan dan pendistribusiannya dari sumberdaya lingkungan. Keberhasilan pengusahaan hutan dari satu sisi dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dari sisi lain sangatlah kontras. Kondisi sosial-ekonomi yang kurang baik dari masyarakat di sekitar hutan dapat mengakibatkan gangguan terhadap sumberdaya hutan bersangkutan.

Kabupaten Sumedang yang memiliki luas tanah kehutanan sekitar 51.927 ha sering dihadapkan pada masalah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan kelestarian hutan di wilayah tersebut. Pada tahun 2002 tercatat terjadi pencurian kayu sebanyak 6.861 pohon, dan kebakaran hutan 47,75 ha (Perhutani, 2002). Kondisi ini terjadi karena pendapatan masyarakat sekitar hutan masih relatif rendah sehingga mereka melakukan pencurian kayu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat sekitar hutan dan untuk ikut serta dalam membangun sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan, Perum Perhutani unit III Jawa Barat membuat program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dengan sistem agroforestri. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti jenis tanaman yang dapat mengoptimalkan lahan hutan dari sistem agroforestri tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi pemanfaatan lahan kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui sistem agroforestri. Adapun tujuan antaranya adalah menduga besarnya erosi dari sistem agroforestri di wilayah penelitian saat ini dan mencari alternatif jenis tanaman agroforestri yang memenuhi asas manfaat dan lestari.


## METODE

### **Kerangka Penelitian**

Dalam sistem agroforestri bentuk penggunaan lahan yang dipraktekkan oleh masyarakat pedesaan beragam dalam bentuk dan model. Masing-masing bentuk mempunyai ciri-ciri yang relevan dengan karakteristik lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya. Salah satu bentuk penggunaan lahan adalah agroforestri yang diyakini mampu memberikan sumbangan terhadap upaya mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan sekaligus sebagai salah satu pendekatan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Sistem agroforestri yang diharapkan optimal, artinya yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), baik untuk produktivitas maupun untuk kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu dianalisis seluruh manfaat dan biaya serta seberapa besar akibat yang ditimbulkannya (analisis manfaat biaya).

Berdasarkan informasi di atas, maka dalam penelitian ini akan dicari manfaat optimum dari pemanfaatan lahan hutan dengan jalan mencari jenis kombinasi tanaman yang dapat memberikan tingkat pendapatan yang maksimal dengan risiko lingkungan yang minimal. Proses yang dibutuhkan untuk menghitung sumberdaya optimal hasil usahatani di wilayah penelitian terdiri dari empat tahap. Keempat tahap tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kawasan hutan Cipadayungan, Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Mei 2005

### Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi literatur  
Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, misalnya peta lokasi, peta curah hujan dan peta kesesuaian lahan untuk vegetasi.
- b. Studi Lapangan  
Studi lapangan dilakukan untuk menentukan data fisik dan kimia tanah, panjang lereng, kemiringan lereng, kedalaman tanah, temperatur udara, pH dan tindakan konservasi.
- c. Analisa Laboratorium dilakukan untuk menentukan kondisi fisik dan kimia tanah (tekstur, pH, retensi hara, dan hara tersedia).
- d. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk menentukan karakteristik sosial-ekonomi responden yang dilakukan secara resmi dan tertutup dengan menggunakan kuesioner.

### Teknik Pengambilan Contoh Tanah

Sampel tanah diambil di 12 lokasi sampel, yang mewakili satuan-satuan peta tanah yang dipilih menurut kemiringan lereng, yaitu yang terletak pada daerah dengan kemiringan lereng (0- < 15)%, (15 - < 30)% dan  $\geq 30\%$ . Untuk keperluan survei sosial-ekonomi, responden diambil dengan menggunakan desain stratifikasi melalui prosedur :

- 1) Populasi dibagi ke dalam strata, setiap stratum terdiri dari unit-unit elementer yang relatif seragam didasarkan atas kepemilikan lahan.
- 2) Setiap stratum dipilih secara acak dan diambil berbanding lurus dengan jumlah unit-unit elementer dalam stratum. Setiap elemen stratum dipilih secara acak dan diambil berbanding lurus dengan jumlah unit-unit elementer dalam stratum dengan rumus:

$$n = \frac{NZ^2_{\alpha/2} \sum N_h S_h^2}{N^2 E^2 + Z^2_{\alpha/2} \sum N_h S_h^2} \dots\dots\dots (1)$$

$$n_h = \left( \frac{N_h}{N} \right) n \dots\dots\dots (2)$$

dimana,

- n = ukuran (total) sampel
- N = ukuran (total) populasi
- $N_h$  = ukuran tiap strata populasi
- $n_h$  = ukuran tiap strata sampel
- E = kesalahan yang dapat ditolerir
- $Z_{\alpha/2}$  = nilai distribusi normal baku dengan tingkat kepercayaan 90%
- $S_h$  = standar deviasi strata dengan pendekatan rumus  $S = R/4$  (R= selisih nilai pengamatan terbesar dan terkecil)

Jumlah populasi sebanyak 590 orang, jumlah sampel seluruhnya 65 orang dengan ukuran setiap strata sebagai berikut: sampel penduduk yang memiliki lahan < 0,25 ha

sebanyak 9, penduduk yang memiliki lahan > 0,5 ha sebanyak 8, dan penduduk yang memiliki lahan antara 0,25 – 0,5 ha sebanyak 48 orang.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


- a. Penentuan prioritas jenis tanaman dianalisis dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*),
- b. Analisis sosial-ekonomi dan lingkungan dianalisis dengan menggunakan sistem dinamis (program Powersim) dan program tujuan ganda. Model powersim disusun dengan sub-subsistem seperti terlihat pada Gambar 2.

Submodel erosi disusun berdasarkan metode USLE dari Arsyad (2000) dengan rumus  $Erosi (A) = RKLSCP$ . Diagram alir dari submodel erosi disusun beserta pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman. Menurut Sudirman, Naik Sinukaban, Suwardjo dan Sitanala Arsyad (1986) dalam Arsyad (2000) pada tingkat erosi 10, 20, 40, dan 60 cm terjadi penurunan produksi menjadi masing-masing 48, 65, 79, dan 86% dari produksi tanpa erosi. Berdasarkan dua unsur tersebut, maka dibuat bentuk diagram submodel erosi pada Gambar 2 (a). Submodel pertumbuhan tanaman, yaitu meliputi faktor pertumbuhan/faktor kematian tanaman, dan probabilitas panen. Jumlah panen ditentukan oleh probabilitas keberhasilan dan penurunan produksi. Probabilitas keberhasilan panen didasarkan pada pengalaman petani dan probabilitas penurunan produksi berdasarkan Arsyad (2000). Submodel pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 2 (c). Submodel ekonomi menggambarkan penghasilan petani dari hasil produksi tanaman. Penghasilan merupakan selisih dari pendapatan hasil penjualan dengan semua biaya aktivitas yang dikeluarkan untuk memproduksi tanaman bersangkutan. Submodel ekonomi dapat dilihat pada Gambar 2 (b).

Komponen-komponen yang digunakan dalam model tujuan ganda meliputi, persamaan kendala tujuan, terdiri dari tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan (erosi), kendala fungsional terdiri dari tenaga kerja, bibit, pupuk dan penjualan, serta fungsi tujuan yang meminimumkan deviasi dari tujuan-tujuan tersebut.


Kabupaten Sumedang berada di antara  $107^{\circ}.44' - 108^{\circ}.21'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}.40'$  sampai  $7^{\circ}.83'$  Lintang Selatan. Batas administrasi kabupaten Sumedang di sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu, sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung, sebelah Selatan dengan Kabupaten Garut, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah hutan Cipayungan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Tanah di wilayah penelitian merupakan tanah andisol, yaitu berasal dari endapan vulkanik dengan batuan breksi. Lapisan bawahnya padat, di lapisan atasnya dilapisi oleh substrata yang tidak terkonsolidasi. Kedalaman tanahnya 120 cm dihitung dari permukaan sampai dengan batuan tidak terkonsolidasi.



(a)

(b)



(c)

Gambar 2. Input analisis sistem dinamis (Powersim)

Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah sekitar 1.522,20 km<sup>2</sup> dengan ciri topografi pada bagian Selatan sebagian berupa pegunungan berbukit dan sebagian di bagian Timur berupa daratan rendah. Keadaan topografi Desa Padasari yang berada pada ketinggian 700

m dpl meliputi dataran rendah, tanah bergelombang sampai berbukit. Jarak antara Desa Padasari dengan Pusat Pemerintahan Kota Kabupaten Sumedang adalah sekitar 12 km.

Kabupaten Sumedang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 23° C dan suhu minimum 19° C. Curah hujan rata-rata antara tahun 1997 sampai dengan 1999 adalah 169,63 mm/tahun, menurut sistem klasifikasi Oldeman termasuk ke dalam tipe D<sub>3</sub>. Berdasarkan klasifikasi tersebut, lahan di wilayah penelitian hanya mungkin ditanami satu kali tanaman palawija (Maman, 1999).

Menurut data potensi Kecamatan Cimalaka semester I, jumlah penduduk Desa Padasari adalah 2.069 orang, terdiri dari 1.036 orang laki-laki dan 1.033 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 598 KK. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.069 orang dan luas wilayah sekitar 2,24 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Desa Padasari mencapai 924 orang /km<sup>2</sup> (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2004).

Tata guna lahan di Kabupaten Sumedang merupakan daerah pertanian, 60% dari luas wilayah dipergunakan untuk sawah dan tegalan, sedangkan luas hutan sekitar 32%. Penggunaan lahan di lokasi penelitian terdiri dari tanah sawah dan darat. Tanah daratan meliputi pekarangan, ladang, kehutanan, dan perkebunan. Penggunaan lahan paling banyak digunakan untuk sawah dan kebun/tegalan, yaitu berturut-turut sebanyak 70,3 Ha dan 64,87 Ha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Erosi yang Terjadi di Wilayah Penelitian

Pendugaan besarnya erosi yang terjadi di wilayah penelitian didapat dengan menggunakan metode USLE. Berdasarkan kondisi lapangan, kelas kemiringan lereng dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu kelas kemiringan lereng (0 ~ <15)%, kelas kemiringan lereng (15 ~ <30)%, dan kelas kemiringan lereng ≥ 30%. Erosi yang terjadi di wilayah penelitian pada kelas kemiringan lereng (0 ~ <15)% dan (15 ~ <30)% berada di bawah erosi yang masih dapat ditolerir, yaitu berturut-turut sebesar 15,69 ton/ha/tahun, dan 28,94 ton/ha/tahun. Sedangkan untuk kelas kemiringan lereng ≥ 30% erosinya lebih besar dari erosi yang masih dapat ditolerir, yaitu sebesar 502,4 ton/ha/tahun. Perbedaan besaran nilai erosi antar kelas kemiringan lereng dikarenakan adanya perbedaan nilai faktor pertanaman (C) dan pengelolaan tanah (P).

Pada kelas kemiringan lereng (0 ~ <15)% dan (15 ~ <30)% vegetasi (tanaman perdu) tumbuh subur, sementara pada bagian lahan yang berlereng ≥30% justru tidak terdapat vegetasi atau walaupun ada vegetasi pertumbuhannya tidak merata menutupi semua permukaan tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarjo (1981) bahwa pada tanah podzolik yang gundul erosi yang terjadi pada kemiringan lereng kelas 3,5% sebesar 90 ton/ha/tahun dan pada kelas lereng 15% sebesar 500 ton/ha/tahun, sedangkan pada tanah latosol yang gundul erosi yang terjadi pada kelas kemiringan lereng 15% sebesar 200 ton/ha/tahun. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Abdurachman *et al.* (1985) yang menyatakan bahwa pada tanah tropudul gundul (tanpa rumput) di Batumarta Sumatera Selatan dengan kemiringan lereng (13~17)%, Putat Yogyakarta dengan

kemiringan lereng (9~10) %, dan Punung (Jawa Timur) dengan kemiringan lereng (10~11) % erosinya berturut-turut mencapai 423,6 ton/ha/tahun, 607,2 ton/ha/tahun, dan 447,8 ton/ha/tahun. Jadi, faktor yang mempengaruhi erosi pada kelas kemiringan lereng  $\geq 30$  % di wilayah penelitian adalah kombinasi jenis tanaman yang diterapkan saat ini tidak mampu melindungi tanah dengan baik sehingga nilai erosi yang terjadi melebihi erosi yang ditolerir, hingga mencapai 11,89 kali. Dengan kondisi tersebut menurut hasil simulasi dengan program sistem dinamis, tanah dengan kedalaman 120 cm pada kelas kemiringan lereng  $\geq 30$  % dalam waktu 34 tahun tanah tersebut akan terkikis habis dan mengakibatkan penurunan produksi sebesar 4,34 % dari produksi tanpa erosi.

### **Pemilihan Jenis Tanaman yang Dapat Mengoptimalkan Lahan Hutan**

Jenis tanaman perkebunan dan hortikultura buah yang dipilih masyarakat untuk dikembangkan di bawah tegakan pinus adalah kopi, lada, vanili, cengkih, mangga, durian, rambutan, jengkol, advokat, petai, sawo, jeruk, nangka, melinjo, pisang, dan kapulaga, sedangkan tanaman pangan dan hortikultura sayur adalah jagung, kacang tanah, lobak, leunca, cabai rawit, caisim, kencur, terung, bawang daun, tomat, dan buncis. Jenis tanaman yang telah dipilih masyarakat kemudian dikonsultasikan kepada para pakar dan diproses dengan metode AHP. Dari hasil proses AHP jenis tanaman yang direkomendasikan para pakar adalah :

- (a) kopi, lada, dan vanili untuk tanaman perkebunan dan hortikultura buah
- (b) cabai rawit dan lobak untuk tanaman pangan dan hortikultura sayur


Kemudian dilakukan analisis ekonomi dan lingkungan dengan program sistem dinamis dan program tujuan ganda. Dalam analisis program sistem dinamis kelima jenis tanaman tersebut dikombinasikan menjadi 9 kombinasi jenis tanaman. Hal ini disesuaikan dengan kondisi wilayah penelitian, yaitu hutan pinus dengan sistem agroforestri berbasis vanili. Kesembilan kombinasi jenis tanaman tersebut adalah pinus-kopi-vanili-cabai rawit, pinus-kopi-vanili-lobak, pinus-lada-vanili-cabai rawit, pinus-lada-vanili-lobak, pinus-lada-vanili, pinus-kopi-vanili, pinus-vanili-cabai rawit, pinus-vanili-lobak dan pinus-kopi-vanili-lada. Secara umum semua kombinasi jenis tanaman tersebut dapat dikembangkan pada kelas kemiringan lereng ( $0 < 15$ )%, karena dampak erosi yang terjadi dari pengembangan kombinasi jenis tanaman tersebut di bawah erosi yang dapat ditolerir. Namun, untuk kelas kemiringan lereng ( $15 < 30$ ) % dan  $\geq 30$  % erosi yang terjadi melebihi erosi yang masih dapat ditolerir.

Untuk mengurangi risiko kerusakan lahan tersebut perlu dilakukan suatu upaya yang dapat menekan besarnya erosi sehingga erosi yang terjadi di bawah erosi yang dapat ditolerir. Sehubungan dengan ini ada dua hal penting yang harus dilakukan jika ingin tetap memanfaatkan lahan kelas kemiringan lereng  $15 < 30$  % dan  $\geq 30$  %, yaitu:

- (1) perlu dilakukan pengelolaan lahan yang lebih baik, (melakukan tindakan konservasi tanah, misalnya dengan membuat teras agar faktor kemiringan lereng dapat diperkecil),
- (2) permukaan tanah tidak disiangi, yaitu tanaman perdu dibiarkan tumbuh sehingga nilai faktor C kecil.

Alternatif tindakan kedua nampaknya lebih memungkinkan untuk dilakukan petani karena petani yang ada saat ini merupakan petani subsisten yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai pembuatan teras. Jika tindakan konservasi dengan vegetasi (perlakuan lahan tidak disiangi) dilaksanakan, maka dampak erosi yang terjadi akan lebih kecil dari erosi yang masih dapat ditolerir. Sebagai contoh dampak dari pengembangan kombinasi jenis tanaman pinus-kopi-lada-vanili dengan perlakuan lahan tidak disiangi pada kelas kemiringan lereng 15~<30 % erosi yang terjadi sebesar 0,66 ton/ha/th, dan 4,02 ton/ha/tahun untuk kemiringan lereng  $\geq 30$  %.

Analisa ekonomi dan lingkungan dilakukan dengan menggunakan program sistem dinamis, dalam simulasi ditentukan 9 kombinasi jenis tanaman yang dapat dikembangkan di wilayah penelitian yang diperkirakan dapat memaksimalkan pemanfaatan lahan hutan. Kombinasi jenis tanaman tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan saat ini, yaitu hutan pinus yang berumur  $\pm 20$  tahun dan telah mengalami penjarangan. Oleh karena itu dalam simulasi program analisis sistem dinamis jarak tanaman diatur sebagai berikut: jarak pinus - pinus 4 x 3 m, vanili - vanili, lada - lada dan kopi - kopi 4 x 3 m, sedangkan jarak cabai rawit - cabai rawit dan lobak - lobak masing-masing 1 x 1 m dan 1 x 0,4 m. Pengaturan jarak tersebut dilakukan agar tidak terjadi kompetisi dan keterbatasan cahaya, hara, dan air. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjad S. (1976) bahwa kerapatan penting untuk diketahui agar sasaran agronomi tercapai, macam varitas memiliki tanggap sendiri-sendiri terhadap kerapatan tanaman untuk mencapai produksi maksimum. Jarak tanam cabai rawit yang baik menurut Sadjad adalah 0,75 x 0,75 m. Jarak tanam vanili dan lada menurut Wahid P. (2000) masing-masing dapat ditanam dengan ukuran 1,5 x 1,5 m dan 1 x 1,5 m. Hasil analisa sistem dinamik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil proses analisis sistem dinamis

Gambar 3 menunjukkan bahwa semua kombinasi jenis tanaman dapat menghasilkan pendapatan yang relatif sama. Namun, dampak erosi yang terjadi berbeda-beda.

Dampak erosi yang terjadi di kemiringan lereng  $0 \sim < 15\%$  erosinya di bawah erosi yang dapat ditolerir, sedangkan di kemiringan  $15 \sim < 30\%$  dan  $\geq 30\%$  erosinya di atas erosi yang dapat ditolerir.

Analisis ekonomi dan lingkungan juga dilakukan dengan menggunakan program tujuan ganda, tujuannya adalah untuk menganalisa seluruh kegiatan usahatani dari jenis-jenis tanaman yang direkomendasikan agar didapat kondisi optimum, yaitu memberikan manfaat maksimal dengan kerusakan lingkungan (erosi) minimal.

Tabel 1. Kerapatan kombinasi jenis tanaman hasil analisa dengan menggunakan metode program tujuan ganda

No.	Kelas Kemiringan Lereng (%)	Kerapatan Kombinasi Tanaman		
		Kopi (pohon)	Vanili (pohon)	Cabai (pohon)
1	$0 < 15$	-	712	1.941
2	$15 < 30$	277	548	-
3	$\geq 30$	279	545	-

Sumber: diolah dari data lapangan 2005

Hasil perhitungan dengan program tujuan ganda, kombinasi jenis tanaman yang dapat mengoptimalkan lahan hutan pada wilayah penelitian adalah pinus-vanili-cabai rawit untuk kemiringan lereng  $0 \sim < 15\%$  dan pinus-kopi -vanili untuk kemiringan lereng  $15 \sim < 30\%$  dan  $\geq 30\%$ . Untuk lebih jelasnya jenis dan kerapatan kombinasi tanaman tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Pendapatan yang akan diperoleh untuk setiap kelas kemiringan adalah sebagai berikut.

a. Pada kelas kemiringan lereng  $0 \sim < 15\%$

Pendapatan yang akan didapat petani dari pengembangan kombinasi pada lereng ini adalah dimulai pada tahun pertama, yaitu didapat dari upah pengelolaan pinus dan hasil panen cabai rawit. Pada tahun ketiga pendapatan petani bertambah dari hasil panen vanili, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan petani dari sistem agroforestri pada kemiringan lereng  $0 \sim < 15\%$

Tahun Produksi ke-	Pendapatan Komoditas		
	Cabai rawit (Rp/ha)	Vanili (Rp/ha)	Total (Rp/ha)
1.	2.938.339	-	Upah pinus +2.938.339
2.	2.938.339	-	Upah pinus +2.938.339
3.	2.938.339	29.040.681	Upah pinus +31.979.020
4.	2.938.339	76.248.395	Upah pinus +79.183.734

## b. Pada kelas kemiringan lereng 15~&lt; 30 %

Pendapatan yang akan didapat petani dari pengembangan kombinasi tanaman pada lereng ini adalah dimulai dari tahun ketiga, yaitu dari pengelolaan pinus dan hasil panen vanili. Pada tahun keempat pendapatan petani akan bertambah dari hasil panen kopi, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan petani dari sistem agroforestri pada kemiringan lereng 15 ~ &lt; 30 %

Tahun Produksi	Pendapatan Komoditas)		
	Kopi (Rp/ha)	Vanili (Rp/ha)	Total (Rp/ha)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	21.958.167	Upah pinus + 21.958.167
4	24.470	58.314.674	Upah pinus + 58.339.144

c. Pada kelas kemiringan lereng  $\geq 30$  %

Pendapatan petani yang akan didapat dari pengembangan kombinasi tanaman dari lereng ini dimulai dimulai dari tahun ketiga didapat dari pengelolaan pinus dan hasil panen vanili. Pada tahun keempat pendapatan petani akan bertambah dari hasil panen kopi, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pendapatan petani dari sitem agroforestri pada kemiringan lereng  $\geq 30\%$ 

Tahun Produksi	Pendapatan Komoditas		
	Kopi (Rp/ha)	Vanili (Rp/ha)	Total (Rp/ha)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	19.991.280	Upah pinus + 20.036.058
4.	9.583	55.392.667	Upah pinus + 55.402.250

Ditinjau dari segi ekologi kombinasi tanaman tersebut memenuhi prinsip efisiensi dalam sistem agroforestri yakni:

- (1) Sistem perakaran kombinasi tanaman pinus-vanili-cabai rawit dan pinus-kopi-vanili dapat memberikan gambaran tingkat persaingan hara yang mungkin timbul. Akar serabut tanaman kopi sekitar 60% terdapat pada lapisan antara (0-20) cm dari permukaan tanah, sedangkan ke samping sebagian besar terdapat pada jarak antara (60 – 90) cm dari batang pokok. Sistem perakaran tanaman vanili adalah akar serabut, perakaran ke samping antara (20- 50 ) cm. Kopi mengambil nutrien dari horizon lebih dalam dari pada tanaman vanili, dan cabai rawit mengambil nutrien dari horizon lebih dangkal dari pada vanili. Jadi kombinasi pinus-kopi-vanili dan pinus-vanili-cabai rawit memberikan keuntungan melalui peningkatan efisiensi serapan hara melalui sebaran akar dan kedalaman akar.
- (2) Dalam pertumbuhannya tinggi tanaman vanili lebih rendah daripada tanaman kopi. Tanaman lada dan vanili merupakan tanaman yang toleran naungan dan secara ekonomi bernilai tinggi. Tanaman lada dan vanili dapat tumbuh di antara atau di

bawah tanaman kopi sehingga cahaya yang lolos dari pohon kopi akan dimanfaatkan oleh tanaman lada/vanili, dan cahaya yang lolos dari naungan vanili akan dimanfaatkan oleh cabai rawit. Jadi, kombinasi pinus-kopi-vanili dan pinus-vanili-cabai rawit memenuhi prinsip efisiensi ruang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode USLE, erosi yang terjadi di wilayah hutan Cipadayungan Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada kelas kemiringan lereng ( $0\% \sim <15\%$ ), dan kelas kelerangan ( $15\% \sim <30\%$ ) adalah normal, karena erosi tersebut lebih kecil dari erosi yang masih dapat ditolerir, dan erosi yang terjadi pada kelas kemiringan lereng  $\geq 30\%$  lebih besar dari erosi yang masih dapat ditolerir.
2. Menurut hasil simulasi menggunakan program analisis sistem dinamis, semua jenis kombinasi tanaman dapat dikembangkan di lereng  $0\% \sim <15\%$ , karena dampak erosi yang terjadi berada di bawah erosi yang dapat ditolerir. Namun, untuk lereng ( $15\% \sim <30\%$ ) dan  $\geq 30\%$  erosi yang terjadi dari dampak pengembangan kombinasi tanaman tersebut melebihi erosi yang dapat ditolerir. Agar kedua lereng tersebut dapat dimanfaatkan, untuk usaha agroforestri, maka seyogyanya lahan yang digunakan tetap ditutup oleh tumbuhan penutup tanah, sehingga erosi yang terjadi akan lebih kecil dari erosi yang dapat ditolerir.
3. Menurut perhitungan dengan menggunakan metode program tujuan ganda kombinasi jenis tanaman yang memenuhi asas manfaat dan lestari dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan pada kelas kemiringan lereng ( $0\% \sim <15\%$ ) adalah pinus-vanili-cabai rawit dan pinus-kopi-vanili pada kelas kemiringan lereng ( $15\% \sim <30\%$ ) dan  $\geq 30\%$  dengan perlakuan lahan tidak disiangi.
4. Sistem perakaran kombinasi tanaman pinus-vanili-cabai rawit dan pinus-kopi-vanili dapat memberikan gambaran tingkat persaingan hara yang mungkin timbul. Kombinasi jenis tanaman tersebut memberikan keuntungan dari peningkatan efisiensi serapan hara melalui sebaran akar dan kedalaman akar.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan kehutanan di wilayah hutan Kabupaten Sumedang dapat dijadikan sebagai model untuk mengevaluasi optimasi pemanfaatan lahan hutan di daerah lain, karena model ini dalam perhitungannya mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial-ekonomi yang disusun berdasarkan keinginan masyarakat, perilaku sistem (melalui subsistem erosi, subsistem pertumbuhan, dan subsistem ekonomi), serta mempertimbangkan kerapatan jenis tanaman sehingga didapat hasil yang optimal.

**Saran**

Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang pada umumnya, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Unit III pada khususnya, disarankan dalam pengembangan pemanfaatan lahan kehutanan di wilayah Cipadayungan, Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, untuk menerapkan agroforestri dengan menggunakan kombinasi jenis tanaman pinus-vanili-cabai rawit untuk kelas kemiringan lereng (0% ~ <15%) dan kombinasi jenis tanaman pinus-kopi-vanili yang lahannya tidak disiangi untuk kelas kemiringan lereng (15%-<30%) dan  $\geq 30\%$ .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurchman A., A.Barus, Undang Kurnia dan Surdiman. 1985. Perenan Pola Tanam dalam Usaha Pencegahan Erosi pada Lahan Pertanian Tanaman Semusim. Jurnal Embr. Pen. Tanah dan Pupuk No.4.
- Arsyad, Sitanala. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: IPB Press.
- Departemen Kehutanan. 1994. Kebijakan Kehutanan Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Departemen : Kehutanan.
- Maman Effendi, Anang Suhardianto. 1999. Klimatologi Pertanian. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Perhutani, 2002. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. Sumedang: Perhutani.
- Sadjad, Sjamsoe'oad. (1976). Bahan kuliah. Agronomi Umum. Tidak dipublikasikan. Bogor: Departemem Ahronomi Fakultas Pertanian IPB.
- Suwarjo. 1981. Peranan Sisa-sisa Tanaman dalam Konservasi Tanah dan Air pada Lahan Tanaman Semusim. Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB.
- Wahid, P. 2002. Budidaya Rempah-rempah dan Tanaman Penyegar. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yakin Addinul. 1997. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Jakarta: Akademika Presindo.