

JRL	Vol. 4	No.1	Hal 19-26	Jakarta, Januari 2008	ISSN : 2085-3866
-----	--------	------	-----------	-----------------------	------------------

## EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU

**Suhendar I Sachoemar**  
 Pusat Teknologi Pertanian  
 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  
 Jl MH Thamrin No 8 Jakarta 10340

### **Abstract**

*An evaluation of the environmental situation of the Seribu Islands water ecosystem was conducted by using the physical and chemical data obtained from various sources. The water quality of the Seribu Island in general was within the range of moderate to good quality with indication poor trend in the southern part due to relatively high turbidity as shown by lower transparency and high of the heavy metal concentration of the Cd and Pb. The situation recommends that the aquaculture activities should be directed to the middle and northern part of Seribu Island to ensure their sustainability.*

*Key words: Kondisi lingkungan perairan, Kepulauan Seribu*

### **1. Pendahuluan**

Perairan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah perairan DKI Jakarta terletak di sebelah luar perairan Teluk Jakarta. Perairan ini secara oseanografis cukup rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, mengingat lokasinya berhubungan langsung dengan Teluk Jakarta tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta yang padat pemukiman dan industri (Anna, 1999).

Secara geografis, perairan Kepulauan Seribu memiliki peran penting dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri kelautan seperti jasa perhubungan laut, *transshipment*, penambangan minyak dan pariwisata. Berbeda dengan kawasan perairan Teluk Jakarta yang disekitarnya sarat dengan dinamika pembangunan berbagai industri manufaktur, pusat perdagangan, pelabuhan dan pelayaran, perkotaan baru berbatasan laut (*water-front city*), pengembangan kawasan perairan Kepulauan Seribu memerlukan kebijakan yang

tepat sesuai dengan karakteristik sumberdaya dan lingkungan perairannya.


Sebagai salah satu ekosistem laut di perairan utara Jakarta, wilayah perairan Kepulauan Seribu didominasi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun dan daratan pulau-pulau karang yang menjadi habitat penting berbagai jenis biota perairan laut (Anonymous, 1991; 1994; 1997 dan 2002).

Pemanfaatan sumberdaya hayati laut terutama sumberdaya ikan menjadi sumber utama penghidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di kepulauan. Sekitar 71,6% penduduk Kepulauan Seribu adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada hasil penangkapan ikan baik di dalam maupun di luar wilayah perairan Kepulauan Seribu. Ikan pelagis, ikan karang, ikan hias, dan biota laut lainnya merupakan target penangkapan para nelayan Kepulauan Seribu. Pengembangan perikanan tangkap meskipun prospektif tetapi memerlukan suatu pengelolaan yang tepat.

Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa populasi sumberdaya ikan semakin menurun. Penurunan ini selain disebabkan oleh penggunaan bahan peledak dan bahan kimia secara meluas untuk penangkapan ikan karang dan ikan hias, juga diduga disebabkan oleh terjadinya penurunan kualitas perairan di Kepulauan Seribu. Untuk mengetahui kondisi lingkungan perairan Kepulauan Seribu maka telah dikumpulkan beberapa data biofisika dan kimia perairan Kepulauan Seribu yang diambil dari berbagai sumber.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah metode survei dengan melakukan pengumpulan data biofisika dan kimia perairan baik melalui survei langsung dilapangan, maupun data sekunder dan informasi dari berbagai sumber. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain data geografi, geologi dan iklim. Kemudian data oseanografi (arus, gelombang), batimetry, dan data biofisika-kimia perairan (Tabel 1). Survei lapangan dilakukan pada bulan Agustus 2004 di beberapa lokasi yang termasuk kedalam wilayah Perairan Kepulauan Seribu Bagian Selatan, Tengah dan Utara (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian di Perairan Kepulauan Seribu

Tabel 1. Parameter biofisika-kimia lingkungan perairan

Parameter		
Fisika	Kimia	Logam Berat
Suhu (°C) pH	pH	Pb (mg/l)
Salinitas (ppm)	DO (mg/l)	Cu (mg/l)
Kecerahan (m)	BOD (mg/l)	
Arus (cm/dtk)	COD (mg/l)	Cd (mg/l)
	Silika (mg/l)	
	Minyak (mg/l)	Hg (mg/l)
	DIN (mg/l)	
	Fosfat (mg/l)	
	Ammoniak (mg/l)	


### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kondisi Geografi dan Iklim


Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 1999, Kepulauan Seribu telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Administratif setingkat dengan wilayah daerah tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta. Secara geografis Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu terletak di lepas pantai utara Jakarta, berbatasan langsung dengan Laut Jawa disebelah utara, timur dan barat. Sedangkan di sebelah selatannya, berbatasan langsung dengan wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Banten dan Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1986 Tahun 2000, wilayah Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau yang secara administratif terbagi kedalam 6 wilayah antara lain: Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa yang termasuk kedalam Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari Kelurahan Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung dan Pulau Pari (Gambar 2). Dari keenam kelurahan tersebut Kelurahan Pulau Kelapa memiliki pulau terbanyak yakni 36 pulau dan yang paling sedikit adalah

Pulau Tidung dengan 6 pulau (Anonymous, 1998 dan 1999).

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah sekitar 1.180,80 ha yang terdiri dari wilayah perairan dengan luas sekitar 6.997,5 km<sup>2</sup> dan gugusan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan berpenghuni seluas kurang lebih 869,71 ha. Pulau-pulau di Kepulauan Seribu relatif tidak terlalu luas. Pulau Tidung Besar dengan luas 50 ha merupakan pulau terbesar di Kepulauan Seribu, kemudian Pulau Payung Besar 20 ha, Pulau Kotok Besar 20 ha, Pulau Sebaru Besar 37 ha dan Pulau Bira Besar 29 ha. Penyebaran pulau di Kepulauan Seribu relatif tidak merata. Berdasarkan sebarannya, gugusan pulau di Kepulauan Seribu dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari gugusan Kepulauan Seribu Utara dengan sebaran pulau-pulaunya yang cukup rapat mulai dari Pulau Peteloran di ujung utara sampai dengan Pulau Karang Besar. Kelompok kedua adalah gugusan Kepulauan Seribu Selatan dengan sebaran pulaunya yang cukup berjauhan yaitu mulai dari Pulau Tidung Besar sampai dengan Teluk Jakarta termasuk pulau yang paling terpencil di Teluk Jakarta yaitu Pulau Sabira (Gambar 3).



Gambar 2. Sebaran Pulau di Kepulauan Seribu



Sumber : Anonymous ( 1998)

Gambar 3. Jumlah Pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu

Kondisi angin di Kepulauan Seribu sangat dipengaruhi angin monsoon yaitu Angin Musim Barat (Desember-Maret) dan Angin Musim Timur (Juni-September). Musim Pancaroba terjadi antara bulan April-Mei dan Oktober-November. Kecepatan angin pada musim Barat bervariasi antara 7-20 knot/jam dan bertiup dari barat daya sampai barat laut. Angin kencang dengan kecepatan 20 knot/jam biasanya terjadi antara bulan Desember-Februari.

Pada musim Timur kecepatan angin berkisar 7-15 knot/jam yang bertiup dari arah Timur sampai Tenggara. Musim basah di Kepulauan Seribu mencapai maksimum pada bulan Januari, sedangkan musim kering mencapai puncaknya pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Tipe iklim di Kepulauan Seribu termasuk tropika panas dengan suhu maksimum 32,3°C, suhu minimum 21,6°C dan suhu rata-rata 27°C serta kelembaban udara 80 mm Hg (Anonymous, 2002).

### 3.2 Batimetri, Oceanografi, Arus dan Pasang Surut

Perairan Kepulauan Seribu termasuk kedalam Paparan Sunda (*Sunda Shelf*) merupakan perairan dangkal dengan kedalaman perairan rata-rata hanya 50 m. Di sekitar pantai kedalamannya bervariasi antara 3 – 10 m dan pada alur pelayaran kedalaman mencapai 25 m. Berdasarkan analisis peta batimetri, sudut lereng dasar perairan di bagian timur perairan Kepulauan Seribu umumnya relatif lebih landai dibandingkan lereng dasar perairan di bagian baratnya. Dari dasar perairan tersebut muncul pulau-pulau karang yang sebagian besar terletak di bagian barat membujur dengan arah utara-selatan, diantaranya yaitu Pulau Bidadari, Pulau Damar, Pulau Anyer dan Pulau Lancang yang secara keseluruhan meliputi 30 pulau karang. Pulau-pulau tersebut muncul dari kedalaman 5-30 meter (Anonymous, 1998 dan 1999).

Kondisi perairan Kepulauan Seribu dipengaruhi musim, pada musim timur tinggi gelombang lebih rendah dibandingkan dengan musim barat yaitu masing-masing berkisar antara 0,5 – 1 m dan 2 – 3 m. Kecepatan gelombang rata-

rata di perairan Kepulauan Seribu relatif rendah yaitu hanya mencapai 1 knot. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari adanya proses peredaman gelombang oleh gugusan pulau yang berserakan di perairan Kepulauan Seribu. Pengukuran di Pulau Pramuka mencatat tinggi gelombang rata-rata sebesar 7,0-69,6 cm dengan periode gelombang 2,4-6,3 detik. Gelombang di daerah tubir akan lebih besar dibandingkan gelombang di kawasan pantai. Oleh karena di pantai terjadi peredaman gelombang oleh rata-rata karang dangkal. Kecepatan arus di Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Karya pada waktu pasang purnama (*spring tide*) sebesar 5 - 49 cm/detik dengan arah bervariasi antara 3° - 35°. Di lokasi yang sama pada saat pasang perbani (*neep tide*) kecepatan arus tercatat sebesar 4 -38 cm /detik dengan arah bervariasi antara 16° - 35°.

Kedudukan air tertinggi dan terendah di Kepulauan Seribu adalah 60 cm dan 50 cm di bawah duduk tengah. Rata-rata tunggang pasang perbani adalah 90 cm dan pasang mati 20 cm. Tunggang pasang tahunan terbesar tercatat sebesar 110 cm. Pengamatan di beberapa pulau di Kepulauan Seribu mencatat tinggi muka laut sebesar 101 cm pada skala Palembang dan tinggi referensi kedalaman peta (*chart datum*) sebesar 65 cm di bawah muka laut rata-rata (Ilahude, 1995; Setiawan and Putri, 1998; Damar, 2003).

### 3.3 Kualitas Lingkungan Perairan

Perairan Kepulauan Seribu yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap bahaya pencemaran baik yang datang dari daratan maupun kegiatan pelayaran dari dan yang menuju pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Secara umum berdasarkan letak geografisnya, perairan Kepulauan Seribu paling tidak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok besar yaitu perairan selatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta (Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang dan Pulau Pari), perairan bagian tengah (Pulau Tidung, Panggang, Pramuka, Semak Daun, Karang Cangkok dan Karang Bongkok), dan perairan bagian utara (Pulau Kelapa). Hal ini terlihat pada gradasi tingkat kecerahan perairan

seperti terlihat pada Tabel 2. Perairan laut dari Teluk Jakarta sampai sekitar Pulau Bidadari dan Pulau Rambut termasuk kelompok selatan. Kelompok ini ditandai dengan keruhnya perairan laut serta relatif miskinnya biota yang berasosiasi dengan terumbu karang. Sedangkan kelompok tengah merupakan perairan laut sekitar Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Semak Daun dan Pulau Karang Congkak. Perairan laut kelompok ini relatif lebih jernih dan kehidupan biotanya lebih bervariasi. Kelompok terakhir adalah perairan laut sekitar Pulau Genteng Besar, Pulau Kaya Angin, Pulau Bima, Pulau Belanda, sampai Pulau Pejaliran Barat. Kawasan ini merupakan kawasan

paling jernih dan biotanya berasosiasi dengan terumbu karang dan lebih bervariasi.

Dengan mengacu kepada hasil penelitian IPB tahun 1997 dan hasil penelitian tahun 2004, terlihat bahwa kadar oksigen terlarut (DO), BOD dan COD, perairan Kepulauan Seribu juga tergradasi secara horizontal dimana konsentrasinya menurun seiring dengan semakin jauhnya dari Teluk Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi bahan organik di perairan Teluk Jakarta hingga Kepulauan Seribu juga tergradasi hampir secara proporsional berdasarkan jarak terhadap Teluk Jakarta seperti terlihat pada konsentrasi nitrogen terlarut (DIN) pada Tabel 2.

Tabel 2. Kualitas Lingkungan Perairan di Kepulauan Seribu

Parameter	Selatan		Tengah		Utara		Baku Mutu
	1997*	2004	1997*	2004	1997*	2004	
<b>Fisika</b>							
Suhu (°C)	29,5	29,4	29,1	29,4	29	30,3	-
Salinitas (ppm)	32	33	32	30,1	32	32	-
Kecerahan (m)	3,75	3-6	5,5	6,6	8	13,6	>3
Arus (cm/dtk)	0,09	-	0,09	0,15	0,05	-	-
<b>Kimia</b>							
pH	7,5	8,3	7,5	7,3	7,5	6,6	6-9
DO (mg/l)	6,4	6,8	5,7	7,2	4,4	7,0	>4
BOD(mg/l)	2,7	3,4	1,9		1,9		<45
COD(mg/l)	162,3	69,3	149,8	74,43	119,9	119,89	<80
Silika (mg/l)	0,011	-	0,009	-	0,01	-	-
Minyak (mg/l)	<0,001	-	<0,001	-	<0,001	-	<5
DIN (mg/l)	0,108	0,021	0,038	0,182	0,064	0,836	<1
Fosfat (mg/l)	0,010	-	0,018	-	0,018	-	-
Ammoniak (mg/l)	-	0,24	0,22		0,25		-
<b>Logam Berat</b>							
Pb (mg/l)	0,005	0,012	0,008	0,006	0,008	0,008	<0,01
Cu (mg/l)	0,138	0,076	0,135	0,152	0,209	0,209	<0,06
Cd (mg/l)	0,028	0,083	0,054	0,016	0,02	0,02	<0,01
Hg (mg/l)	0,056	0,025	0,038	0,001	0,025	0,025	<0,003

Anonymous (1997 dan 1998)\*

Dengan mengacu kepada nilai baku mutu berdasarkan SK Menteri KLH No. 02/MenKLH/I/1988 tertanggal 19 Januari 1988, kadar DO dan BOD masih masuk dalam kisaran layak guna, namun untuk nilai COD ternyata sudah melebihi ambang batas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan di Teluk Jakarta hingga Kepulauan Seribu sudah cukup kritis. Demikian halnya untuk kadar logam berat seperti Cu, Cd dan air raksa (Hg) telah melebihi ambang batas. Melihat kondisi yang demikian maka dalam perencanaan pengembangan budidaya laut perlu dilakukan secara hati-hati baik dalam pemilihan jenis komoditas maupun penyusunan tata ruang kegiatan budidayanya agar tidak hanya kepentingan produsen saja yang bisa terwakili, tetapi keamanan konsumen nantinya juga perlu diperhatikan dengan baik. Dengan perencanaan yang baik diharapkan kepercayaan konsumen akan keamanan produk budidaya yang dihasilkan dari perairan Kepulauan Seribu dapat meningkat, sehingga daya saing usahanyapun menjadi lebih baik.

#### **4. Penutup**

Secara umum kondisi perairan Kepulauan Seribu baik bagian selatan, tengah maupun utara dalam keadaan baik meskipun untuk parameter COD relatif lebih tinggi dari nilai baku mutu perairan yang ditentukan untuk mendukung budidaya. Untuk nilai kecerahan semakin ke selatan, nilai kecerahan semakin rendah, artinya perairan bagian selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan Teluk Jakarta dimana 13 sungai dengan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi mengalir dan bermuara di Teluk Jakarta. Demikian halnya dengan logam berat Cd dan Pb semakin ke selatan, konsentrasinya semakin tinggi. Dari kondisi yang demikian, maka kegiatan budidaya laut sebaiknya di arahkan di bagian tengah dan utara Kepulauan Seribu yang kualitas perairannya relatif lebih baik dan berhadapan dengan laut terbuka sehingga daya dukung perairannya masih cukup baik.